

	<p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL “Latte Fieno di pecora” STG</p> <p align="center">TABELLA DI DETERMINAZIONE QUOTA DI FORAGGIO GREZZO</p>	<p align="center">ALL 2</p> <p align="center">al PC52</p> <p align="center">Rev.1</p>
---	---	--

Determinazione quota di foraggio grezzo

La produzione di Latte fieno è una produzione di latte a base di foraggi grezzi disciplinata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/487 recante l'iscrizione della denominazione “Latte fieno di pecora” nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) **modificato con successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 70/2022 della Commissione del 12 gennaio 2022.**

La razione di base dell'alimentazione estiva è costituita da foraggi provenienti da pascoli degli alpeggi, da pascoli, da prati stabili e dai mangimi consentiti di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione del 24 ottobre 2018 (2018/400/04), punto 4.2 (normativa sulla produzione del latte fieno). Durante il periodo invernale gli animali sono essenzialmente nutriti con fieno e mangimi consentiti di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione del 24 ottobre 2018 (2018/400/04), punto 4.2 (normativa sulla produzione del latte fieno). Durante tutto l'anno non è consentita la somministrazione di alimenti fermentati (insilati, mangimi fermentati fieno umido o fermentato).

I foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale del mangime a secco. Nei casi in cui sia necessario bilanciare la razione o sia necessario provvedere alla somministrazione di vitamine è possibile integrare la razione con un alimento concentrato; nella razione alimentare degli ovini la quantità media di alimenti concentrati aziendali viene limitato ad un massimo del 25% della massa secca assunta durante l'intero anno.

Calcolo del foraggio/mangime concentrato per una pecora da latte

Per una resa lattiera fino a 240 kg una pecora assume 657 kg di foraggio in massa secca all'anno.

Assunzione di foraggio totale in kg sostanza secca/anno	Resa lattiera (240 in media)	Fattore di ingestione di foraggio	25% sostanza secca/anno	Foraggio concentrato con l'88% di sostanza secca annua
657 kg	Fino 240 kg	1,0	164 kg	187 kg FC

Con l'aumentare della resa lattiera aumenta anche l'assunzione di sostanza secca; aumentando la resa lattiera di 120 kg il fattore di assunzione di foraggio va incrementato di 0,23.

Resa lattiera (240 in media)	Fattore di assunzione di foraggio	Mangime concentrato/Pecora 25% Arrotondato nell'anno	Mangime concentrato/UBA 25% Arrotondato nell'anno
Fino a 240 kg	1,00	187 kg	1.244 kg
241-360 kg	1,23	230 kg	1.531 kg
361-480 kg	1,46	273 kg	1.817 kg
481-600 kg	1,69	315 kg	2.103 kg
601-720 kg	1,92	358 kg	2.389 kg
721-840 kg	2,15	401 kg	2.675 kg
841-960 kg	2,38	444 kg	2.961 kg
Oltre 960 kg	2,61	487 kg	3.248 kg

Esempio di calcolo della quantità massima di foraggio secco in un'azienda latte fieno

Esempio di azienda: 5 UBAB costituiti pecore da riproduzione, da agnelli e capi da ingrasso, 100 pecore da latte, 700 kg di latte (resa media di stalla in litri secondo il controllo funzionale)

	PIANO DI CONTROLLO DEL "Latte Fieno di pecora" STG TABELLA DI DETERMINAZIONE QUOTA DI FORAGGIO GREZZO	ALL 2 al PC52 Rev.1
---	--	--

Regola del 25% di mangime concentrato	Numero UBAB	Mangime concentrato/UBAB	Kg totali di mangime concentrato
Agnelli e capi da ingrasso	5	1.244 kg	6.220 kg
Pecora da latte, 700 resa media di stalla	15	2.389 kg	35.835 kg
Quantità totale di mangime concentrato			42.055 kg

Considerando la percentuale massima di mangime concentrato utilizzabile in azienda pari a 25%, la quantità annua massima utilizzabile è di 42.055 kg.

Verifica del rispetto del limite per la suddetta azienda (max. il 25% di mangime concentrato)

Acquisto supplementare di mangime concentrato	Mangime concentrato prodotto in azienda	Mangime concentrato totale	Consistenza preesistente 1/1/2019	Consistenza residua 31/12/2019	Mangime concentrato impiegato come mangime
6 x 5.000 kg 30.000 kg	2 ha ogni 5.500 kg 11.000 kg MC	41.000 kg MC	5.000 kg	10.000 kg	36.000 kg

+ per pecore da riproduzione, agnelli e capi da ingrasso il fattore di assunzione di foraggio è 1,0
+ per pecore da latte il fattore di assunzione di foraggio dipende dalla resa lattiera; per la resa lattiera si impiega la media di stalla ricavata dal controllo funzionale, per le aziende senza controllo funzionale la resa media di stalla viene calcolata dalla fornitura di latte, altri tipi di commercializzazione nonché latte destinato agli agnelli:

- le UBA (bovino) vengono determinate secondo il seguente l'elenco degli animali
 - ovini con età inferiore a 1 anno 0,07 UBAB/capo
 - ovini con età superiore 1 anno 0,15 UBAB/capo
 - Definizione di foraggio grezzo/grossolano: tutti i mangimi elencati nel seguito sono considerati foraggio grezzo:
 - foraggio da prato stabile e avvicendato, foraggi provenienti da pascoli e da pascoli degli alpeggi, fresco e secco (fieno)
 - colture arative in cui tutte le piante vengono utilizzate come foraggio verde o seccate
 - colture arative in cui tutte le piante vengono utilizzate come foraggio verde o secco
 - paglia
 - pellet di farina d'erba, mais, erba medica
 - barbabietola da foraggio non lavorata
 - latte e prodotti sostitutivi del latte destinati al (all'alimentazione del) bestiame giovane
- gli alimenti non elencati, sono considerati come mangimi concentrati.

Determinante è il fatto che la quantità di foraggio concentrato venga calcolata non per il singolo capo di bestiame, bensì per l'intera consistenza di capi e sull'assunzione di massa secca nell'anno.